

## COMUNICACIONES EN FORMA DE PANEL

Los paneles permanecerán expuestos desde el viernes 4 y se organizarán, en la medida de lo posible, en función de su temática. Se ruega a los autores permanezcan en sus proximidades durante las horas reservadas a los paneles.

**Sábado 5 de diciembre de 2007, de 16:00 h a 17:00 h**

**Domingo 6 de diciembre de 2007, de 9:00 h a 10.00 h**

P. Acevedo, J. Ferreres, R. Jaroso, M. Durán, M. A Escudero, J. Marco y C. Gortázar. Estudio comparativo de métodos basados en grupos fecales para la estima de la abundancia de corzos en ambientes mediterráneos.

P. Acevedo y R. Real. Diferencias biogeográficas entre las dos subespecies de *Capra pyrenaica*, *C. p. victoriae* y *C. p. hispanica*: implicaciones para la conservación.

C. Aguilar, M. Pôdra, A. Gómez, A. Roura, S. Oreca, M. Ferrer y S. Palazón. Situación actual y conservación del visón europeo en La Rioja, España.

O. Aizpurua, J. Aihartza, A. Alberdi e I. Garin. Determinación morfológica y biométrica de las tres especies del género *Plecotus* en los Pirineos.

A. Alberdi, I. Garin, O. Aizpurua y J. Aihartza. Primera cita confirmada de murciélago bicolor (*Vespertilio murinus* L., 1859) en la Península Ibérica.

S. Alís, M. Narváez, J. C. Rivilla y J. Román. Distribución y abundancia de la rata de agua (*Arvicola sapidus*) en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva.

F. J. Almansa, X. Pardavila, N. Yelo y E. J. Martínez. Modelo de distribución de madrigueras de tejón (*Meles meles* L., 1758) en la región de Murcia mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica.

J. A. Arce. Empleo de excrementos de nutria (*Lutra lutra*) para la diagnosis específica de los cangrejos de río.

V. Arévalo, P. García y M. Lizana. Flexibilidad y adaptación trófica de la nutria paleártica (*Lutra lutra*) en medios acuáticos de montaña de Salamanca.

C. M. Arija, M. R. Recio, E. Virgós y S. Cabezas-Díaz. Abundancia y patrones de actividad del zorro (*Vulpes vulpes*) en ambientes humanizados de España central.

J. Arques, A. Belda, V. Peiró, J. E. Martínez y A. Pastor. Datos preliminares de la abundancia y distribución de conejos (*Oryctolagus cuniculus*) en el Parque Natural de la Sierra de Mariola (Alicante).

A. Barón, J. Román y E. Revilla. Se hace camino al andar: modelos de cruce de caminos por mamíferos.

R. Barrientos. Efecto del hábitat y del cebo empleado en el éxito de captura de micromamíferos.

I. C. Barrio, P. Acevedo y F. S. Tortosa. Métodos de estima de abundancia de conejo en zonas agrícolas.

J. Barrull, I. Mate, J. G. Casanovas, J. Ruiz-Olmo y J. Gosálbez. El control de predadores y su papel en la estructuración de una comunidad de carnívoros mediterráneos.

M. Basto, N. Pedroso, A. Mira y M. Santos-Reis. Uso de reservas de agua de pequeño y mediano tamaño por nutrias en un ecosistema mediterráneo.

G. Belamendia. Importancia de la educación ambiental para la conservación de los mamíferos.

A. Belda, J. Arques, V. Peiró, E. Seva y J. E. Martínez. Estudio de la diversidad de mamíferos en el Parque Natural de la Sierra de Mariola (C. Valenciana) mediante fototrampeo.

R. Belenguer, A. Belda, J. Arques, J. E. Martínez y B. Zaragoza. Aplicación del trampeo fotográfico en el estudio del jabalí (*Sus scrofa*).

J. Bernardo, L. Quaglietta, A. Mira y C. Fonseca. Uso del espacio en una población de nutrias en ambientes humanizados.

G. Bueno, I. C. Barrio, R. García-González, C. L. Alados y D. Gómez-García. ¿Afectan las hozaduras de jabalí a las zonas de pastoreo del ganado en los pastos alpinos pirenaicos? .

J. R. Burger, A. S. Chesh, R. A. Castro, L. Ortiz, I. Torre, L. A. Ebensperger y L. D. Hayes. La influencia del tipo de trampa en la evaluación de la estructura poblacional del roedor *Octodon degus* en Chile central.

M. Cabana y J. V. López-Bao. Patrones de distribución de marta (*Martes martes*) y garduña (*Martes foina*) en paisajes antropogénicos: análisis a gran escala y concurrencia espacial.

S. Cabezas-Díaz, E. Virgós, J. Mangas y J. Lozano. La importancia clave de los madroños para determinar la abundancia de la garduña en paisajes mediterráneos.

G. Calvo , J. M. Fedriani, M. Zywiec y M. Delibes. Abundancia de roedores predadores de semillas de piruétano: variaciones espacio-temporales en Doñana.

E. de la Calzada, A. Fuentes y F. Jubete. Los casos de osos muertos (2000-2009) ponen en evidencia la gestión de la especie por parte de la Junta de Castilla y León.

M. A. Campos, M. Sáenz de Buruaga y F. Canales. Distribución del lobo (*Canis lupus*) en la Comunidad Autónoma del País Vasco (España).

F. Canales, M. Sáenz de Buruaga, M. A. Campos y N. Navamuel. Estima de la abundancia de jabalí (*Sus scrofa*) en medios forestales mediante rastreo con perros.

R. Carrasco-García, C. Gortázar, J. Carrasco-Naranjo, M. Durán, J. J. Negro, Á. Gómez-Manzaneque, C. Rodríguez-Vigal y J. Vicente. Contribución relativa al uso de carroñas de ungulados por la comunidad de vertebrados, factores determinantes y riesgos asociados a la transmisión de enfermedades en áreas mediterráneas.

J. Carrasco-Naranjo, E. Maio, P. Acevedo, R. C. Soriguer, R. Carrasco-García, M. Boadella, J. M. Sánchez, C. Górtazar y J. Vicente. Epidemiología molecular y espacial en el jabalí en montes de Toledo.

F. Carro y O. Ceballos. Seguimiento del conejo (*Oryctolagus cuniculus*) en el espacio natural de Doñana.

M. Casado-Cruz, N. E. Medarde y J. Ventura. Crecimiento postnatal de la mandíbula en la rata de agua, *Arvicola sapidus*.

A. Ceña y J. C. Ceña. Mortalidad y dieta del lobo en el Sistema Ibérico septentrional.

J. C. Ceña y A. Ceña. Tipología de las madrigueras de cría utilizadas por el visón europeo (*M. lutreola*) en España.

J. M. Chaparro, A. Vargas y J. Calzada. Efecto del enriquecimiento ambiental sobre la conducta de cachorros de lince ibérico, *Lynx pardinus*, nacidos en cautividad.

Y. Cortes, J. C. Blanco, I. Carbonell y B. Pliego. Análisis de la eficacia de los métodos de prevención de ataques de lobo puestos en práctica por el proyecto Life Coex en España.

M. Costa, G. Ferrão da Costa, A. Guerra y F. Petrucci-Fonseca. Uso del maxent para predecir la idoneidad del hábitat para el lobo en una región del norte de Portugal.

I. Cotilla, M. Delibes-Mateos, E. Ramírez, F. Castro, B. D. Cooke y R. Villafuerte. Propuesta de un modelo de vigilancia de las poblaciones de conejo mediante el análisis de las prevalencias frente a la ehv y la abundancia poblacional.

J. Crespo, A. Izquierdo, R. Belenguer, M. Surroca y J. Jiménez. Ingresos de carnívoros en los centros de recuperación de fauna de la Comunidad Valenciana. Una revisión de los últimos 16 años.

D. Delgado, C. S. Yuste, J. Calzada, I. Martínez, J. Mata y M. Á. Delgado. Variaciones espaciales en la comunidad de micromamíferos de la provincia de Huelva.

M. Delibes-Mateos, J. E. Swenson y M. R. Frisina. Estructura poblacional y parámetros reproductivos de poblaciones de castores americanos sometidas a diferentes intensidades de trampeo.

M. A. Díaz-Portero. Avance del atlas de distribución de los mamíferos carnívoros de la provincia de Jaén.

C. Díez, M. E. Alonso y V. Gaudioso. Análisis de la influencia de determinados factores en el tiempo de estancia del conejo de monte (*Oryctolagus cuniculus*, L. 1758) en el exterior de los vivares.

J. Duarte, M. A. Farfán, P. J. Rubio y J. M. Vargas. ¿Atraen los vertederos a los carnívoros?

M. Durán, J. L. Van Oss y C. González-Rebeles. Monitoreo del desplazamiento de dos grupos de venado de cola blanca (*Odocoileus virginianus couesi*), liberados dentro de la Reserva de la Biosfera "La Michilía" en la Sierra Madre occidental de Durango, México.

A. Estrada, R. Real y J. M. Vargas. ¿Están las áreas importantes para los mamíferos en Andalucía cubiertas por la Red Natura 2000?

C. Feliu, A. Ribas, P. Foronda, C. Milazzo, J. Torres, J. Miquel y J. Matías. Helmintofauna de *Mus domesticus* en ecosistemas insulares (Islas Canarias y Sicilia).

C. Ferreira, M. Delibes-Mateos, C. Rouco, C. A. Rios, F. Díaz-Ruiz, J. Fernández de Simón, P. Ferreras y R. Villafuerte. ¿Se puede mejorar la efectividad de la gestión del hábitat para recuperar las poblaciones de conejo de monte?

M. V. Fuentes, S. Sainz-Elipe, S. Sáez-Durán y M. T. Galán-Puchades. Naturaleza biológica de las comunidades helmintianas de pequeños mamíferos como bioindicadora de la regeneración postincendio en ecosistemas mediterráneos.

D. Galicia, I. Orbegozo y C. Escala. Perspectiva temporal en la variación de la comunidad de micromamíferos asociada a un entorno agrícola en Navarra.

V. García, J. M. Rey y J. C. Jaramillo. Características del ciclo reproductor del topo ibérico, *Talpa occidentalis*, en el noroeste de la Península Ibérica.

M. García-Pando, A. Sánchez-Chardi, J. J. Egozcue y M. J. López-Fuster. Estudio de la asimetría fluctuante en la musaraña común, *Crocidura russula* (Soricomorpha: Soricidae): efecto de la contaminación ambiental.

R. Garcia-Perea y J. Gisbert. Problemas de conservación del topillo de cabrera *Microtus cabrerae*. El caso de las poblaciones de la carretera M-501.

S. Garcia-Rodríguez y A. Navarro. Estimación del impacto económico del turismo lobero en la Sierra de la Culebra (Zamora).

X. Gerrickagoitia, R. Juste y M. Barral. El género *Angiostrongylus* en carnívoros silvestres en la Península Ibérica. Primera descripción de *A. daskalovi*.

M. A. Gómez, J. Pinedo, J. López de Luzuriaga, M. Pôdra, A. Roura, M. Ferrer y S. Palazón. ¿Es posible preservar la presencia del visón europeo, con un control continuado del visón americano en Álava?

C. Grilo, M. Cruz, F. Ascensão, J. Bissonette y M. Santos-Reis. Modelación de los efectos de la alteración del hábitat para los carnívoros en el sur de Portugal: implicaciones para su conservación.

D. Guixé y J. Camprodon. Efectividad del trampeo fotográfico en la ocupación del hábitat del urogallo por parte de grandes mamíferos en bosques subalpinos del Pirineo.

J. Herrero, O. Fernández-Arberas, C. Prada, A. García-Serrano y R. García-González. La cabra montesa *Capra pyrenaica hispanica* inicia la recolonización de los Pirineos.

A. Lamosa, X. Pardavila, J. G. Mangas, C. Pérez, C. Maroñas y P. Martín. Distribución y selección de hábitat del gato montés (*Felis silvestris* Schreber, 1777) en el P. N. de la Serranía de Cuenca.

- J. F. Layna. Seguimiento de oso pardo en Galicia y gestión de su hábitat.
- T. León, V. Ruiz, M. Á. Simón, Á. Sánchez, F. Martín y B. Soria. Criopreservando el patrimonio genético del lince ibérico (*Lynx pardinus*) a partir de biopsias epiteliales. Efecto específico de agentes crioprotectores.
- M. Lizana, P. García, I. Mateos y R. Vicente. Distribución del desmán ibérico (*Galemys pyrenaicus*) en el sur de Salamanca.
- L. Llana, E. J. García, V. Palacios y V. García. Alimentación del lobo en los Ancares lucenses.
- F. Llimona, S. Cahill, A. Tenés, S. Carles y L. Cabañeros. Radioseguimiento post recuperación de erizos comunes (*Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758) en el Parque de Collserola (Barcelona).
- J. López de Luzuriaga. Nuevos datos sobre la distribución de la nutria (*Lutra lutra*) en Álava.
- G. López-Zamora, J. M. Gil-Sánchez, I. Zorrilla, F. Martínez, M. López-Parra, L. Fernández-Pena, G. Garrote, G. Ruiz, C. Martínez-Granados y M. A. Simón. Análisis de las causas recientes de mortalidad en las poblaciones silvestres de lince ibérico.
- P. Lucas, A. García-Serrano, C. Prada, O. Fernández-Arberas, A. Giménez-Anaya y J. Herrero. Uso y selección del hábitat por parte de los carnívoros y lagomorfos en el Parque Natural del Moncayo.
- A. L. Márquez, R. Real y A. Estrada. Análisis de la transferibilidad en el tiempo de los modelos de distribución: distribución futura de *Capra pyrenaica*.
- F. J. Márquez, A. J. Rodríguez-Siles, A. J. Caruz, J. J. Rodríguez-Liévana y J. M. Muñoz-Cobo. Especies del género *Bartonella* (Proteobacteria, Rhizobiales) detectadas en mamíferos domésticos y silvestres de la provincia de Jaén.
- R. Martínez, S. Sánchez, A. García-Sánchez, J. Blanco, J. E. Blanco, J. M. Benítez-Medina, J. Rey y J. M. Alonso. El conejo (*Oryctolagus cuniculus*) y la liebre (*Lepus granatensis*) como reservorios silvestres de cepas verotoxigénicas de *Escherichia coli* en Extremadura.
- A. Martínez-Fontúrbel, M. Narváez y M. Delibes. Islas artificiales para nutrias en un embalse de Andalucía (S Península Ibérica).
- R. de la Mata-Pombo, J. César-Aldariz y G. Mucientes-Sandoval. Protocolo para el seguimiento de una comunidad de mamíferos en Galicia. Resultados preliminares.

I. Mate, J. Barrull, J. Gosálbez y J. Ruiz-Olmo. Distribución y selección de hábitat de *Arvicola sapidus* en el Parque Natural de la Serra de Montsant. Resultados preliminares.

M. Matos, N. Lopes-Pinto y C. Fonseca. Los murciélagos del Bosque Nacional de Bussaco, centro de Portugal.

M. A. Monsalve, A. Castelló, A. Alcocer, D. Almenar, B. Sarzo, J. V. Bataller, F. Cervera, M. A. Bartolomé, M. Vilalta y A. Pradillo. Tendencia de las poblaciones de *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus mehelyi*, *Myotis capaccinii*, el grupo *Myotis myotis*/*M. blythii* y *Miniopterus schreibersii* en la Comunidad Valenciana.

X. Morales, J. Martínez-Cedeira, F. Turnes y A. López. Divulgando a pie de mar: un estudio de las interacciones cetáceos-pesca y un proyecto de sensibilización ambiental del sector pesquero en Galicia.

J. Morales, E. Peñín y M. Lizana. Depredación ocasional por el jabalí *Sus scrofa* L., favorecida por la fuerte sequía de 2009, sobre la población más amenazada de la náyade *Margaritifera margaritifera* L. (Bivalvia: Mollusca) en la Cuenca del Duero.

F. Muñoz, M. J. López-Fuster y J. Ventura. Evolución fenotípica de los módulos mandibulares en un sistema Robertsoniano de *Mus musculus domesticus*: implicación de los factores de aislamiento.

M. Napal, I. Garin, U. Goiti, E. Salsamendi y J. Aihartza. Nuevas aportaciones a la distribución de *Myotis bechsteinii* en Álava y Navarra, y variables ecológicas que la determinan.

S. Oreca, A. Gómez, M. Pôdra, B. Sanz y S. Palazón. Expansión del visón europeo hacia el este de su área de distribución: primeros datos en Aragón.

S. Palazón, A. Gómez, M. Podra, J. López de Luzuriaga, A. Roura, C. Aguilar, S. Oreca y M. Ferrer. Estructura, densidad y supervivencia de una población de visón europeo en la cuenca alta del río Ebro, España.

D. Paniagua, J. Echegaray, A. Illana, O. Aurtenetxe, X. Gerrickagoitia, A. L. García-Pérez y M. Barral. Organización espacial y estado sanitario de las poblaciones de tejón (*Meles meles*) en el P. N. de Gorbeia (Álava, España).

J. Paula, M. Mascarenhas, A. Santos, A. Lemos, H. Costa y F. Pacheco. La utilización de equipos caninos en la búsqueda y detección de cadáveres de murciélagos y aves.

O. de Paz, G. Pérez-Suárez, S. Martínez y C. Rodríguez-Vigal. Distribución y uso de hábitat de los murciélagos en el centro de Quintos de Mora (Toledo).

N. Pedroso, E. Santos, F. Loureiro, A. R. Martins, M. Lecoq y P. Hotham. El papel del programa lince (Ipn/ffi) en la recuperación del hábitat y de las presas del lince ibérico en el sur de Portugal.

M. Pereira, A. Rodríguez y F. Palomares. Patrón de movimiento del meloncillo (*Herpestes ichneumon*) en dos paisajes mediterráneos con distinta estructura.

A. Peris, L. Tena y A. Villena. Abundancia de ginetas (*Genetta genetta*) en un encinar mediterráneo. Estimación mediante trampeo fotográfico.

P. Pinheiro, C. Encarnação, H. Marques, P. Santos y A. Mira. Comparación del uso de diferentes tipos de madrigueras artificiales por conejo *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758) en programas de reintroducción.

A. Piñeiro. El marcaje fecal en el gato montés (*Felis silvestris*) y su función en la defensa de áreas favorables de caza.

M. Pôdra, V. Asensio, A. Gómez, J. López de Luzuriaga, R. Pérez, H. Agirre, M. Arenas, G. Martí, M. Ferrer y S. Palazón. Primera experiencia en España de liberación de ejemplares de visón europeo para reforzar la población en los humedales de Salburua, Álava.

L. Puentes, M. Mulero, J. J. Negro, M. Ferrer y M. de Lucas. Proyecto AEROMAB (tecnologías aeroespaciales aplicadas a la conservación del medio ambiente) "aplicaciones para el estudio de mamíferos terrestres".

F. J. Quirós y J. Marcos. La gestión cinegética en la evolución del trofeo de rebeco cantábrico (*Rupicapra pyrenaica parva*).

R. G. Ràfols, C. Flaquer, X. Puig y A. Arrizabalaga. Métodos aplicados en Cataluña y Andorra para lograr la implicación de la sociedad en la conservación de los Quirópteros.

A. Ribas, R. Mesa, G. Molina-Vacas, D. Rodríguez-Teijeiro, C. Feliu, I. Torre y A. Arrizabalaga. Helmintos craneales y pulmonares del tejón (*Meles meles*) en Cataluña.

E. Rico, B. Terrones, J. L. Cantó y A. Bonet. Impacto del tráfico rodado sobre la mastofauna del P. N. Carrascal de la Font Roja. Influencia de las características del trazado.

C. A. Ríos, F. Castro, J. M. Vargas y R. Villafuerte. Primeras aproximaciones del aprovechamiento y la gestión cinegética de mamíferos en Castilla-La Mancha.

J. C. Rivilla, S. Alís, C. Gutiérrez-Expósito, M. D. Cobo y M. Máñez. Varamientos de mamíferos marinos en el litoral de Doñana (Huelva, SO España).

A. Rodríguez, F. Jubete, C. Zumalacárregui, C. González, J. Prieto, A. Bello y A. Herrero. Análisis y resultados preliminares del control de las poblaciones de visón americano en el Canal de Castilla (Palencia).

M. Rodríguez, R. Mathieu, R. Maloney, S. Stevenson y P. Seddon. Telemetría GPS y teledetección para cuantificar la ecología espacial de mamíferos depredadores introducidos en Nueva Zelanda. Estudio con gatos asilvestrados.

O. Rodríguez, A. Oleaga, M. Prieto, A. Espí, A. Balseiro, R. Casais, J. Márcos y C. Gortázar. Seguimiento sanitario del rebeco cantábrico en el Principado de Asturias.

P. Rodríguez, F. S. Tortosa, C. Rodríguez-Vigal, Y. Fierro, C. Gortázar y J. Vicente. Efecto de la alimentación suplementaria sobre las características de la historia natural en crías de ciervo ibérico (*Cervus elaphus hispanicus*) en zonas mediterráneas.

A. J. Rodríguez-Siles, M. A. Díaz-Portero y B. Álvarez. Mortalidad por atropello de los mamíferos carnívoros en la provincia de Jaén, una primera aproximación.

R. Romero. Dieta del visón americano (*Neovison vison*) en la isla de Sálvora (Parque Nacional de las Islas Atlánticas) en relación con la disponibilidad de recursos.

D. Romero y R. Real. Favorabilidad ambiental de las especies de carnívoros amenazados de España peninsular y pronóstico de cambio climático a lo largo del siglo XXI.

S. Roques, J. A. Godoy, F. Palomares, C. Chavez, C. Keller, R. Sollmann, M. Furtado, N. M. Furtado, A. A. Jácomo y L. Silveira. Salud genética y patrones espaciales del jaguar (*Panthera onca*) en áreas centrales y marginales de su distribución: un estudio piloto usando métodos no invasivos.

L. M. Rosalino, D. Ferreira, I. Leitão y M. Santos-Reis. Patrones de uso de diferentes componentes de hábitats agroforestales mediterráneos por el ratón de campo *Apodemus sylvaticus*.

C. Rouco, A. Bertó, V. Morlanes y S. Moreno. Carnívoros oportunistas viviendo a costa de programas de recuperación de conejo de monte (*Oryctolagus cuniculus*).

A. Ruano, J. Naves, J. L. Acuña, P. Silva y S. Solano. ¿Son adecuadas para los Cetáceos las previsiones de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) en el Cantábrico central?

G. Ruiz, J. A. Franco de Tena, M. López-Parra, L. Fernández-Pena, G. López-Zamora, M. I. García-Tardío, R. Arenas, A. J. Rodríguez, G. Garrote y M. A. Simón. Resultados preliminares de los dos primeros reforzamientos genéticos de la población de lince de Doñana.

P. Ruiz-Capillas, C. Mata y J. E. Malo. Efecto de las autovías en los patrones generales de abundancia de depredadores y presas del entorno.

M. Sáenz de Buruaga, M. A. Campos y F. Canales. Estima del número mínimo de lobos en la Comunidad Autónoma del País Vasco (España) mediante rastreos en nieve.

M. Sáenz de Buruaga, M. A. Campos y F. Canales. Modelo de potencialidad para la reproducción del lobo (*Canis lupus*) en la Comunidad Autónoma del País Vasco (España).

S. Sainz-Elipe, S. Sáez-Durán, M. T. Galán-Puchades y M. V. Fuentes. Evolución poblacional de pequeños mamíferos en el Parc Natural de la Serra Calderona (Comunitat Valenciana), un ecosistema mediterráneo en regeneración postincendio.

S. Sánchez, R. Martínez, M. D. Vidal, A. García, J. Blanco, J. E. Blanco, A. Mora, A. Echeita, J. M. Alonso y J. Rey. Detección y caracterización de *Escherichia coli* verotoxigénicos en jabalíes abatidos en Extremadura.

M. A. Sans-Fuentes, J. García-Valero, J. Ventura y M. J. López-Fuster. Efecto de las translocaciones Robertsonianas en la espermatogénesis del ratón doméstico.

G. Santulli, S. Palazón, J. Ruiz-Olmo y J. Gosálbez. Modelización de la distribución potencial del visón americano (*Neovison vison*) en Cataluña e implicaciones en la gestión de su control.

P. Sarmiento, J. Cruz, C. Eira y C. Fonseca. Evaluación de la utilización de foto-trampeo para determinar la abundancia de zorro (*Vulpes vulpes*).

V. Sazatornil, A. Rivadulla, V. Palacios, E. J. García y P. Galán. Impacto del lobo en los parámetros poblacionales del caballo en régimen de semilibertad del noroeste ibérico.

L. P. da Silva, J. Alves, M. Matos y C. Fonseca. Rapaces como controladores de pequeños mamíferos en Portugal: el caso de la lechuza común.

L. Soler y M. J. Palacios. Uso de hábitat por *Chrysocyon brachyurus* y otros carnívoros silvestres del nordeste argentino: ¿flexibilidad comportamental para su conservación?

L. Soriano, A. Martínez-Fontúrbel, M. Casas-Marcé, M. Delibes y J. A. Godoy. Identificación individual de excrementos de nutria.

A. Such-Sanz y D. Saavedra. Comunidad de micromamíferos del hábitat afroalpino del Macizo de Abune Yosef (Etiopia).

J. Talegón. Descripción de casos de fraude en supuestos daños de lobo al ganado. Problemática y soluciones.

L. Tapia, J. Domínguez y L. Rodríguez. Uso del hábitat de la liebre ibérica *Lepus granatensis* y el conejo de monte *Oryctolagus cuniculus* en un área montana de Galicia.

B. Terrones, E. Rico, J. L. Cantó y A. Bonet. Conectividad ecológica de mamíferos carnívoros en paisajes mediterráneos. El Paraje Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura-Canalons (Alcoi, Alicante).

R. Torres, J. Santos, C. Fonseca y J. Linnell. Tiempo de descomposición de heces de corzo (*Capreolus capreolus*) y de venado (*Cervus elaphus*) en un mosaico mediterráneo en el noreste de Portugal.

S. Trenado, S. Pinya y J. M. Piña. Datos preliminares sobre la muerte por atropello de los mamíferos carnívoros silvestres en las carreteras de Mallorca.

M. Vergara, O. Razkin, A. Ruiz-González, M. J. Madeira, F. Urra y B. J. Gómez-Moliner. Nuevos datos sobre distribución del género *Martes* obtenidos mediante métodos no invasivos.

M. D. Vidal, M. Boadella, S. Sánchez, E. Mateu, J. Vicente, M. Barral, J. Larrasa y C. Gortázar. Estudio retrospectivo de *Salmonella* spp en jabalíes diagnosticados en el IREC: casos clínicos esporádicos y screening en varias fincas de caza.

M. Viota, J. V. López-Bao, A. Rodríguez y F. Palomares. Cambios en el comportamiento espacial del zorro en presencia de lince.

F. J. Yerga, A. Vargas, A. Rivas, X. Manteca y J. Calzada. Patrones de actividad de cachorros de lince ibérico, *Lynx pardinus*, nacidos en cautividad.

C. S. Yuste y J. Calzada. Ausencia de orificio en la apófisis angular de la mandíbula en los lirones caretos (*Eliomys quercinus*) de la Península Ibérica y Baleares.

